

Инструкция по применению лекарственного препарата - Гардасил (вакцина против вируса папилломы человека квадριвалентная рекомбинантная - типов 6Д1Д6Д8)

Иммунобиологические свойства и иммуногенность: проведение полного курса вакцинации приводит к профилактике заболеваний, вызываемых ВПЧ, образованию специфических антител к четырем типам ВПЧ (6Д1Д6Д8) более чем у 98 % вакцинируемых и формированию защитного иммунитета против вируса папилломы человека.

Лекарственная форма: стерильная суспензия во флаконе с разовой дозой вакцины для всех возрастных групп вместимостью 0,5 мл. Произведено: Мерк Шарп и Доум Корп, США.

Показания к применению: вакцина Гардасил показана к применению с 9 лет, для предупреждения предраковых генитальных поражений рака шейки матки, вульвы, влагалища и анального канала.

Способ применения и дозы: вакцину Гардасил вводят внутримышечно в дельтовидную мышцу (область плеча), разовая доза для всех возрастных групп составляет 0,5 мл.

Рекомендуемый курс вакцинации состоит из 3-х доз и проводится по схеме (0-2-6):

- первая доза - в назначенный день;
- вторая доза - через 2 месяца ,после первой ;
- третья доза - через 6 месяцев после первой.

Курс вакцинации считается завершенным, даже при нарушении интервала между прививками (если 3 прививки сделаны в течении года).

Стоимость 1 дозы составляет 12.500 рублей, курс составляет 3 дозы - 37.500 рублей. Постановка вакцины по системе ОМС - не производится.

Место проведения: постановка вакцины осуществляется в здании КДЦ ,3 этаж, кабинет 349, без предварительной записи, часы работы с 11.00-до 14.00, (кроме субботы и воскресенья).

Для проведения ПЕРВИЧНОЙ вакцинации необходимо:

- направление гинеколога, полученное по месту жительства или Центра - по предварительной записи, для решения вопроса о возможности вакцинации.

- заключение терапевта , полученное по месту жительства или Центра - по предварительной записи, о том ,что нет противопоказаний для вакцинации, полученное в день постановки Гардасила.

Для проведения ПОВТОРНОЙ вакцинации необходимо:

-только заключение терапевта, полученное по месту жительства или Центра - по предварительной записи, о том, что нет противопоказаний для вакцинации, полученное в день или накануне постановки Гардасила.

После проведения вакцинации выдается сертификат, документально подтверждающий проведение вакцины препаратом Гардасил (съёмные этикетки с номером серии и сроком годности).